


Equação fundamental da ondulatória

Apresentação e demais documentos: fisicasp.com.br


Professor Caio

1. Onda senoidal




- **A fonte** das perturbações e pontos do meio em MHS
- Pontos A, C e E: **Cristas**
- Ponto B e D: **Vales**
- **A: Amplitude** de Oscilação
- Os pontos A, C e E oscilam em concordância de fase
- Os pontos A e B oscilam em oposição de fase
- Os pontos do meio repetem o movimento da fonte


1. Onda senoidal



1. Onda senoidal




1. Onda senoidal



λ : **Comprimento da onda.** É a distância entre dois pontos sucessivos que oscilam em concordância de fase. Para determinar o comprimento de onda, também podemos medir a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos.


1. Onda senoidal



Oscilação Completa: ocorre quando um ponto oscila e retorna a sua configuração inicial e o ciclo começa a se repetir. Para uma onda **senoidal**, em uma oscilação completa, um ponto percorre uma distância que corresponde a quatro amplitudes ($4 A$).

Período de oscilação (T): é o intervalo de tempo necessário para que a fonte ou um ponto do meio execute uma oscilação completa. No S.I. o período é medido em segundos.

1. Onda senoidal



Frequência de oscilação (f): A frequência de oscilação de uma fonte ou de um ponto do meio exprime o número de oscilações executadas por unidade de tempo.

$$f = \frac{\text{quantidade de oscilações}}{\Delta t}$$



$$f = \frac{1}{T}$$

No S.I. a frequência é medida em Hertz (Hz)

Relação importante: $1\text{Hz} = \frac{1 \text{ oscilação}}{s}$

2. Equação fundamental

$t_0 = 0$



A equação é válida para ondas:


- Mecânicas
- Eletromagnéticas
- Transversais
- Longitudinais


Equação fundamental

A equação fundamental calcula a velocidade de propagação.

A equação fundamental não calcula a velocidade de oscilação!

Exercícios








(Fuvest-SP) A figura representa uma onda harmônica transversal, que se propaga no sentido positivo do eixo x em dois instantes de tempo: $t = 3$ s (linha cheia) e $t = 7$ s (linha tracejada).



Dentre as alternativas, a que pode corresponder à velocidade de propagação dessa onda é

- a) 0,14 m/s
- b) 0,25 m/s
- c) 0,33 m/s
- d) 1,00 m/s
- e) 2,00 m/s







Pulso ou onda transversal



Propagação na direção perpendicular à oscilação.



(Unesp-SP) Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador e um ponto P que descreve um movimento harmônico vertical, indo desde um ponto mais baixo (vale da onda) até um mais alto (crista da onda).



Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de 10 m/s e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P, em m/s, quando ele vai de um vale até uma crista da onda no menor intervalo de tempo possível é igual a

- a) 4
- b) 8
- c) 6
- d) 10
- e) 12